

Bosk[®]Seed

Seed Solutions

CONTROL Arbustiva Biodiversidade



Descrição:

Mistura de sementes de espécies arbustivas autóctones de Portugal Continental. Espécies de ocorrência espontânea no país, com importante valor ecológico. Plantas com elevada capacidade de adaptação ao meio, o que lhes confere grande valor ecológico. Elevada resistência a condições ambientais extremas. Os sistemas radiculares conferem estabilidade superficial e profunda aos solos. Depois de instalada não necessita de rega e manutenção.

Aplicações:

Desenvolvida para aplicação em hidrossementeiras em locais onde é necessário um desenvolvimento rápido da vegetação para estabilização do terreno e onde se quer recuperar a paisagem silvestre.

Composição da mistura

40% <i>Retama sphaerocarpa</i>	8% <i>Rosmarinus officinalis</i>
15% <i>Rosa canina</i>	2% <i>Lavandula stoechas</i>
12% <i>Cytisus scoparius</i>	2% <i>Cistus salviifolius</i>
12% <i>Coronilla valentina</i>	1% <i>Erica arborea</i>
8% <i>Ulex europaeus</i>	

Embalagens

Sacos de 10 e 25Kg.

Embalada em sacos de papel resistentes aos raios UV e condições atmosféricas.

Armazenamento

Conservar as sementes na embalagem original, em local fresco e seco, entre 5 a 25 °C, ao abrigo de luz intensa e diferenças acentuadas de temperatura. Proteger a embalagem de possíveis danos de chuvas, ventos, elevadas temperaturas.

Época de sementeira

Qualquer época do ano, mas de preferência na primavera ou no outono.

Preparação do terreno

A hidrossementeira adapta-se a todos os tipos e morfologias de solo e condições muito adversas. Se o objetivo for um coberto vegetal homogêneo deve-se evitar:

- Terreno muito irregular e/ou com muitas pedras, entulhos.
- Solos muito drenantes (fraca retenção) como areias, pedras ou com camada arável delgada.
- Terrenos suscetíveis a infestantes (antigos pousios).
- Parcelas já cobertas com prado, relvado ou infestantes.¹

¹É possível hidrossemejar parcelas já cobertas com prado, relvado ou muitas infestantes, mas deve-se adaptar a quantidade de fibra a aplicar de acordo com o coberto vegetal existente, de modo a que as sementes e as raízes das novas plantas consigam entrar em contacto com o solo.

Dose de sementeira

5 a 7 g/m²

Esta mistura deve representar 5% da mistura total; os restantes 95% deverão ser de uma mistura de herbáceas de instalação rápida (Ex. Boskgreen Control ECO ou SUPREME). A instalação das espécies herbáceas dá-se rapidamente, permitindo uma proteção imediata e prolongada do solo e a outras sementes autóctones, normalmente com um desenvolvimento mais demorado.

Não devem ser adicionados componentes à mistura à exceção dos previamente prescritos para o efeito.

A densidade de sementeira indicada aplica-se a solos de boa qualidade, com rega casual e com temperaturas amenas. A densidade da sementeira deverá ser maior se:

- a permeabilidade do solo for elevada;
- a época de sementeira não for a ideal;
- a temperatura do solo for muito baixa;
- houver risco de infestantes.

Como as circunstâncias podem diferir de caso para caso e as condições de aplicação do produto estão fora do nosso controlo, a Atlanlusi Europe, Lda. não se responsabiliza por quaisquer resultados diferentes do previsto.

Marca propriedade da Serraic - Create and Innovate, Lda.

BOSK[®] é uma marca registada por Serraic - Create and Innovate, Lda.

ATLANLUSI Europe | www.atlanlusi.com

FAMÍLIA: SEMENTES | TIPO: SEMENTES ORNAMENTAIS | CATÁLOGO: BOSKSEED | PROJ. 1526 - SUG. 1606



Manutenção

A germinação da semente depende da temperatura e humidade, logo, em caso de seca, regar no período de germinação. A rega pontual é necessária se as plantas forem sujeitas a um período prolongado de seca, principalmente durante o período de instalação, em que as plantas ainda são jovens. Depois de instalada não necessita de rega e manutenção.

Características da mistura

Botânica

Famílias botânicas Leguminosae, Rosaceae, Lamiaceae, Ericaceae

Morfologia

Porte Arbustivo e sub-arbustivo
Duração Perene
Altura média 2 m
Época de floração Primavera/Verão
Cor da floração Multicolor

Fisiologia

Período vegetativo Inverno
Longevidade Anos
Sequestração de azoto Elevada
Período de germinação 2-3 meses
Período de estabelecimento 6-12 meses

Ecologia

Clima Atlântico/Mediterrânico
Exposição solar Elevadas
Necessidades hídricas Baixas
Tipo de solo Indiferente
pH do solo Indiferente
Necessidades nutricionais Baixas
Atracção de biodiversidade Elevada

Tolerâncias

Salinidade Média
Geadas Elevada
Seca Elevada
Encharcamento Média
Sombra Média
Poluição Elevada

Como as circunstâncias podem diferir de caso para caso e as condições de aplicação do produto estão fora do nosso controlo, a Atlanlusi Europe, Lda. não se responsabiliza por quaisquer resultados diferentes do previsto.

Marca propriedade da Serraic - Create and Innovate, Lda.

BOSK® é uma marca registada por Serraic - Create and Innovate, Lda.