

Bosk[®]Seed

Seed Solutions

CONTROL SUPREME DRY

Descrição:

Mistura de sementes ideal para projectos de controlo de erosão de solos em zonas secas em Clima Mediterrânico. Adequada a zonas irregulares, inclinadas e expostas aos vários agentes erosivos. Composta por espécies herbáceas de elevada resistência a condições ambientais extremas; os sistemas radiculares conferem estabilidade superficial e profunda aos solos.

Aplicações:

Desenvolvida para aplicação em hidrossementeiras em locais onde é necessário um desenvolvimento rápido da vegetação para estabilização do terreno e controlo da erosão. Não devem ser adicionados componentes à mistura à excepção dos prescritos para o efeito.

Composição da mistura

- 35% *Festuca arundinacea*
- 15% *Festuca rubra rubra*
- 13% *Lolium multiflorum*
- 12% *Festuca ovina*
- 7% *Medicago sativa*
- 5% *Onobrychis viciifolia*
- 3% *Lotus corniculatus*
- 2,5% *Cynodon dactylon*
- 0,5% *Sanguisorba minor*

Dose de sementeira

25 a 35 g/m²

A densidade de sementeira indicada aplica-se a solos de boa qualidade, com irrigação casual e com temperaturas amenas. A densidade da sementeira deverá ser maior se:

- a permeabilidade do solo for elevada;
- a época de sementeira não for a ideal;
- a temperatura do solo for baixa;
- houver risco elevado de infestantes.

Época de sementeira

Qualquer época do ano.



Preparação do terreno

A hidrossementeira adapta-se a todos os tipos e morfologias de solo e condições muito adversas. Se o objetivo for um coberto vegetal homogéneo deve-se evitar:

- Terreno muito irregular e/ou com muitas pedras, entulhos.
- Solos muito drenantes (fraca retenção) como areias, pedras ou com camada arável delgada.
- Terrenos suscetíveis a infestantes (antigos pousios).
- Parcelas já cobertas com prado, relvado ou infestantes.¹

¹É possível hidrossemeiar parcelas já cobertas com prado, relvado ou muitas infestantes, mas deve-se adaptar a quantidade de fibra a aplicar de acordo com o coberto vegetal existente, de modo a que as sementes e as raízes das novas plantas consigam entrar em contacto com o solo.

Manutenção

A germinação da semente depende da temperatura e humidade, logo, em caso de seca, regar no período de germinação. A rega pontual é necessária se as plantas forem sujeitas a um período prolongado de seca, principalmente durante o período de instalação, em que as plantas ainda são jovens. A instalação das espécies herbáceas dá-se rapidamente, permitindo uma proteção imediata e prolongada do solo.

Armazenamento

Conservar as sementes na embalagem original, em local fresco e seco, ao abrigo de luz intensa. Proteger de possíveis danos à embalagem, chuvas, ventos, elevadas temperaturas.

Embalagens

Sacos de 10 Kg.

Como as circunstâncias podem diferir de caso para caso e as condições de aplicação do produto estão fora do nosso controlo, a Atlanlusi Europe, Lda. não se responsabiliza por quaisquer resultados diferentes do previsto.

Marca propriedade da Serraic - Create and Innovate, Lda.

BOSK[®] é uma marca registada por Serraic - Create and Innovate, Lda.

ATLANLUSI Europe | www.atlanlusi.com

FAMÍLIA: SEMENTES | TIPO: SEMENTES DE PRADO | CATÁLOGO: BOSKSEED | PROJ. 1526 - SUG. 1606



Características

Morfologia

Porte	Herbáceo
Duração	Anuais e perenes
Altura média	50-100 cm

Fisiologia

Sequestração de azoto	Elevada
Período de germinação	10-15 dias
Período de estabelecimento	1 a 2 meses

Ecologia

Clima	Mediterrânico
Exposição solar	Elevada
Necessidade hídrica	Baixa
Necessidade nutricional	Baixa
Tipo de solo	Indiferente
pH do solo	Indiferente
Atracção de biodiversidade	Elevada

Como as circunstâncias podem diferir de caso para caso e as condições de aplicação do produto estão fora do nosso controlo, a Atlanlusi Europe, Lda. não se responsabiliza por quaisquer resultados diferentes do previsto.

Marca propriedade da Serraic - Create and Innovate, Lda.

BOSK® é uma marca registada por Serraic - Create and Innovate, Lda.