

Bosk[®]Seed

Seed Solutions

CONTROL TENOR

Descrição

Mistura de sementes de espécies herbáceas para um prado florido. Os sistemas radiculares conferem estabilidade superficial e profunda aos solos. Mistura de alta qualidade adequada a zonas de escassa irrigação. Resistente a condições adversas.

Aplicações

Desenvolvida para aplicação em hidrossementeiras em locais onde é necessário um desenvolvimento rápido da vegetação para estabilização do terreno e onde se pretende um aspeto de prado florido silvestre.

Armazenamento

Conservar as sementes na embalagem original, em local fresco e seco, entre 5 a 25°C, ao abrigo de luz intensa e diferenças acentuadas de temperatura. Proteger a embalagem de possíveis danos de chuvas, ventos, elevadas temperaturas.

Composição da mistura

- 58% *Festuca rubra rubra*
- 40% *Festuca ovina*
- 2% Mistura de flores- Euroflor Tenor

A instalação das espécies gramíneas dá-se rapidamente, permitindo uma proteção imediata e prolongada do solo e às sementes de flores, normalmente com um desenvolvimento um pouco mais lento.

Dose de sementeira

40 a 50 g/m²

A densidade de sementeira indicada aplica-se a solos de boa qualidade, com irrigação casual e com temperaturas amenas. A densidade da sementeira deverá ser maior se:

- a permeabilidade do solo for elevada;
- a época de sementeira não for a ideal;
- houver risco elevado de infestantes.

Época de sementeira

Qualquer época do ano, mas de preferência na primavera ou no outono.



Preparação do terreno

A hidrossementeira adapta-se a todos os tipos e morfologias de solo e condições muito adversas. Se o objetivo for um coberto vegetal homogéneo deve-se evitar:

- Terreno muito irregular e/ou com muitas pedras, entulhos.
- Solos muito drenantes (fraca retenção) como areias, pedras ou com camada arável delgada.
- Terrenos suscetíveis a infestantes (antigos pousios).
- Parcelas já cobertas com prado, relvado ou infestantes.¹

¹É possível hidrossemejar parcelas já cobertas com prado, relvado ou muitas infestantes, mas deve-se adaptar a quantidade de fibra a aplicar de acordo com o coberto vegetal existente, de modo a que as sementes e as raízes das novas plantas consigam entrar em contacto com o solo.

Manutenção

A germinação da semente depende da temperatura e humidade, logo, em caso de seca, regar no período de germinação. A rega pontual é necessária se as plantas forem sujeitas a um período prolongado de seca, principalmente durante o período de instalação, em que as plantas ainda são jovens.

Embalagens

Sacos de 10 Kg.

Como as circunstâncias podem diferir de caso para caso e as condições de aplicação do produto estão fora do nosso controlo, a Atlanlusi Europe, Lda. não se responsabiliza por quaisquer resultados diferentes do previsto.

Marca propriedade da Serraic - Create and Innovate, Lda.

BOSK[®] é uma marca registada por Serraic - Create and Innovate, Lda.

ATLANLUSI Europe | www.atlanlusi.com

FAMÍLIA: SEMENTES | TIPO: SEMENTES DE PRADO | CATÁLOGO: BOSKSEED | PROJ. 1526 - SUG. 1606



Características da mistura

Botânica

Famílias botânicas Graminae e outras

Morfologia

Porte Herbáceo
Duração Anuais e perenes
Altura média 0,5 m
Época de floração Principalmente Primavera/Verão
Cor da floração Branco e rosa

Fisiologia

Período vegetativo Inverno
Longevidade Anos
Sequestração de azoto Elevada
Período de germinação 15-20 dias
Período de estabelecimento 2 meses

Ecologia

Clima Atlântico/ Mediterrânico
Exposição solar Média
Necessidade hídrica Baixa
Necessidade nutricional Baixa
Tipo de solo Indiferente
pH do solo Indiferente
Atracção de biodiversidade Média

Tolerâncias

Salinidade Média
Geada Média
Seca Elevada
Encharcamento Média
Sombra Média
Poluição Elevada

Como as circunstâncias podem diferir de caso para caso e as condições de aplicação do produto estão fora do nosso controlo, a Atlanlusi Europe, Lda. não se responsabiliza por quaisquer resultados diferentes do previsto.

Marca propriedade da Serraic - Create and Innovate, Lda.

BOSK® é uma marca registada por Serraic - Create and Innovate, Lda.